

フレカイニド 酢酸塩錠50mg・100mg「KO」 を服用される方へ

このくすりは、心臓に作用し脈を整えるくすりです。
以下の注意事項を守って服用してください。

このくすりを飲むときに注意すること

- 心疾患、腎機能障害、肝機能障害がある場合は、必ず医師または薬剤師に伝えてください。
- 妊娠、妊娠している可能性がある、授乳中の方は医師または薬剤師に相談してください。
- 一緒に飲んではいけなくすりがありますので、既に飲んでいくすりがある場合は、必ず医師または薬剤師に伝えてください。

一緒に飲んではいけなくすり

- リトナビル（抗ウイルス薬）
- ミラベクロン（過活動膀胱治療薬）

※上記以外でも他に飲んでいくすりがある場合は医師または薬剤師に相談してください。

- 医師に決められた用量にしたがって、服用してください。
- 飲み忘れた場合には、1回飛ばして次に飲む時間に1回分を飲んでください。絶対に2回分は飲まないでください。

小児の場合（乳児・幼児含む）

- 医師に決められた用量を1日2～3回に分けて服用します。必ず指示された服用方法にしたがってください。
- 母乳や乳製品は、くすりの成分の吸収に影響することがあるので、必ず医師または薬剤師に相談してください。

必ず裏面もお読みください

つぎのような症状が出たときは、
早めに医師または薬剤師に連絡してください。

症 状

- 動悸(ドキドキする)、胸の不快感、息切れ
- 頭痛、めまい、ふらつき
- 悪心、吐き気、お腹の痛み、食欲がない
- 体がだるい、皮膚や白目が黄色い
- 発疹、体のかゆみ

※上記以外でも気になる症状が出た場合は、
必ず医師または薬剤師に相談してください。

医療機関名



寿製薬株式会社

2018年9月作成