

ロルキシカム錠 2mg・4mg「KO」 を服用される方へ

このおくすりは、炎症に伴うはれや痛みをやわらげます。

通常は、関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、頸肩腕症候群、肩関節周囲炎などや手術やけがをした後、また歯を抜いた際の炎症や痛みを抑えるために用います。

このおくすりを飲むときに注意すること。

- 医師または薬剤師に指示された用量にしたがって、飲んでください。
- 飲み忘れた場合には、気が付いたときにできるだけ早く飲んでください。ただし、次の通常飲む時間が近い時は、1回分飛ばしてください。絶対に2回分を一度に飲まないでください。
- このおくすりは、吸湿性があるので湿気をさけて保管し、服用直前にPTPシートから取り出してください。

次のような方は飲む前に必ず医師または薬剤師にご相談ください。

- 以前におくすりを飲んでかゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- 消化管疾患、血液疾患、肝障害、腎障害、心機能不全、高血圧症またはその既往歴がある方。
- アスピリン喘息またはその既往歴、気管支喘息がある方。
- 妊婦、妊娠している可能性がある、または授乳中の方。

必ず裏面もお読みください >>

つぎのような症状が出たときは、すぐに服用を中止し、
医師または薬剤師にご相談ください。

症 状

- 悪心、吐き気、お腹の痛み、吐血・下血
- 体がだるい、皮膚や白目が黄色くなる
- 発疹、体のかゆみ、目の充血
- 蕁麻疹、呼吸困難、目や口元のはれ

など

※上記以外でも気になる症状が出た場合は、
必ず医師または薬剤師にご相談ください。

医療機関名



寿製薬株式会社