




# マーズレン<sup>®</sup> 配合錠 0.375・0.5・1.0ES

## をお飲みになる方へ

	0.375ES	0.5ES	1.0ES
			
飲む量	1日6～8錠	1日6錠	1日3錠
飲む回数	3～4回に分けて	3回に分けて	

※製剤写真は実物大です

**年齢、症状によりおくすりを飲む量が増減する場合があります。  
医師の指示にしたがってください。**

### ▶ このおくすりのはたらき

このおくすりは胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎の治療に使用されます。消化管粘膜に作用し、炎症を抑え、傷ついた粘膜を修復し症状を改善します。

### ▶ おくすりを飲み忘れた場合

飲み忘れた場合、気が付いたときにできるだけ早く飲んでください。ただし、次の飲む時間が近いときは、1回分飛ばしてください。

# マーズレン<sup>®</sup> 配合錠 0.375・0.5・1.0ES

## をお飲みになる方へ

▶ 以下の症状が出たら、服用をやめ、  
医師または薬剤師に相談してください。

- 便秘、下痢、お腹が張る
- 発疹、じんましん、かゆみなど
- 悪心、吐き気

上記以外でも気になる症状が出た場合は、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

### このおくすりの飲み方

- 医師に指示された用法・用量にしたがって飲んでください。
- 水またはぬるま湯といっしょに飲んでください。口の中や舌の上でやわらかくしてから飲むこともできます。



↑ 取り出す



※PTPシートの場合は、かならずシートから取り出してください。

医療機関名