

ナラトリプタン錠 2.5mg [KO]を お飲みになる患者さんへ

服用する時の注意

以下の注意事項を守って正しく服用してください。

- このくすりは、片頭痛を改善するくすりです。
医師に決められた服用量を必ず守ってください。
- 頭痛発作が起きた時にのみ服用してください。
予防を目的として服用しないでください。
- このくすりは1回1錠服用します。
効果不十分の場合には、1錠追加できますが、
必ず4時間以上間隔をあけてください。
なお、1日の服用量は2錠以内としてください。
- 肝臓または腎臓に障害がある人は、
1日の服用量が1錠と決められていますので
注意してください。
- このくすりを服用しても全く効果がない場合には、
他の原因による頭痛の可能性がありますので、
服用を中止し医師に相談してください。

ナラトリプタン錠 2.5mg「KO」を お飲みになる患者さんへ

以下のような症状が出た時は、すぐに服用を中止して、
医師または薬剤師に相談してください。

- ふらつき、冷や汗が出る
- めまい、頭痛
- 顔が青白い
- のどがかゆい
- 動悸、息苦しさ、胸の痛み
- 手足が冷たくなる
- 全身のかゆみ、じんま疹

※上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

医療機関名