

ゾニサミド錠 100mg EX「KO」 を服用される方へ

**このおくすりは、てんかん発作を抑える
抗てんかん剤です。**

脳内の神経の過剰な興奮をしずめ、てんかん発作を抑えます。
通常、てんかんの部分発作、全般発作、混合発作に用いられます。

このおくすりを飲むときに注意すること。

- ▶ 医師・薬剤師に指示された服用方法にしたがって、飲んでください。自分の判断で量を減らしたり、中止したりしないでください。
- ▶ 飲み忘れた場合には、気が付いたときにできるだけ早く飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い時は、1回分飛ばしてください。絶対に2回分を一度に飲まないでください。
- ▶ 眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下が起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作は行わないでください。

**次のような方は飲む前に必ず医師または薬剤師に
ご相談ください。**

- ▶ 以前におくすりを飲んでかゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- ▶ 肝臓に障害のある方。
- ▶ 妊婦、妊娠している可能性がある方、または授乳中の方。
- ▶ 他におくすりを飲んでいる（作用を強めたり、弱めたりする可能性がある）。

裏面も必ずお読みください ↷

このおくすりの服用中に気をつけてほしいこと。

死にたい気持ちになるなどの精神症状があらわれた場合、すぐ医師に相談してください。

つぎのような症状が出たときは、すぐに服用を中止し、
医師または薬剤師に相談してください。

- 症状**
- 発疹、掻痒感、紅斑・水泡、咽頭痛
 - 発熱、汗をかかなくなる
 - 眠気、ふらつき、体がだるい、気力低下
 - 食欲不振、腹痛、吐き気、口内炎、下痢
など

※上記以外でも気になる症状が出た場合は、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

医療機関名